

Mycoplasma Genitalium

El **mycoplasma genitalium** también lo podemos conocer como el micoplasma genital. La infección del mycoplasma genitalium se produce por una bacteria que se transmite por medio de las relaciones sexuales, vaginales, orales o anales por lo que es una [enfermedad de transmisión sexual](#) .

El mycoplasma genitalium se encuentra en la uretra y en los genitales, pero también se puede alojar en la garganta y en el ano." En el hombre, es la primera causa de la [uretritis](#) y en la mujer está asociada a la [vaginosis bacteriana](#) , inflamación del cuello del útero, inflamación de las trompas y [enfermedad pélvica inflamatoria](#) .

Contagio del mycoplasma genitalium

El **mycoplasma genitalium** , se puede contagiar por medio de:

- Relaciones sexuales anales, orales y vaginales sin el uso de un [método anticonceptivo](#) adecuado.
- Con las manos y dedos que han estado tocando los genitales y el ano de la persona infectada.
- Por medio de juguetes sexuales compartidos con una persona infectada.
- Si se tienen múltiples parejas sexuales y realizas prácticas de riesgo (no protegidas)

Prevención del mycoplasma genitalium

Para prevenir esta ETS, se recomienda las mismas medidas de prevención que para cualquier otra infección sexual, el uso de [preservativos](#) y una reducción de los comportamientos sexuales de riesgo.

Síntomas del mycoplasma genitalium

Los síntomas del mycoplasma genitalium pueden ser:

Síntomas del mycoplasma genitalium en el hombre

- Inflamación de la uretra que ocasiona ardor y dolor al orinar.
- Inflamación de la próstata."
- Salida de secreciones por la uretra. "
- Dolor e inflamación en las articulaciones, etc."

Síntomas del mycoplasma genitalium en la mujer

- Dolor al orinar."
- Inflamación de la vejiga."
- Dolor en la zona pélvica. "
- Dolor durante las relaciones sexuales. "
- Flujo vaginal con olor fuerte."
- Enrojecimiento de la uretra."

- Dolor al caminar, etc. "

Diagnóstico y Tratamiento del mycoplasma genitalium

Es difícil de diagnosticar y tratar el **mycoplasma genitalium** porque se confunde con la [gonorrea](#) y la [clamidia](#) . Además el mycoplasma genitalium es un organismo de crecimiento lento, el aislamiento y cultivo tarda hasta 6 meses. Por lo tanto el diagnóstico del mycoplasma genitalium, se realiza mediante las siguientes pruebas:

- Muestra de las secreciones de la uretra (hombre y mujer)."
- Muestra de las secreciones del cuello del útero (mujer)."
- Muestra de la primera orina de la mañana (hombre y mujer).

El tratamiento es con antibióticos.