

Preguntas frecuentes sobre Enfermedades de transmisión sexual

¿Los condilomas pueden producir esterilidad?

Los [condilomas](#) no producen esterilidad. Pero pueden ser responsables de lesiones precancerosas en el cuello del útero o incluso producir el cáncer de cuello de útero.

[Respuesta ofrecida por clínicasabortos.com](#)

¿Una persona con SIDA puede pasarle la enfermedad a su hijo?

Si los padres están infectados por el [VIH](#) el niño tiene grandes posibilidades de ser infectado.

Puede pasar que exista una relación sexual entre un hombre que está infectado y una mujer que está sana, de esta manera el contagio de la enfermedad es a la madre del futuro bebé.

También puede pasar que la mujer esté infectada y le transmita la enfermedad al hombre que está sano, por lo tanto, se transmitirá la enfermedad al posible bebé.

Hoy en día existen técnicas de lavado de semen que consiguen eliminar el virus presente en el líquido corporal. Si la madre no está contagiada por el VIH, esta técnica junto con una inseminación artificial puede conseguir que el hijo nazca sano, al mismo tiempo evitamos que la madre pueda contagiarse de la enfermedad.

No es una técnica que sea segura al 100%, pero si tiene muchas garantías de éxito.

[Respuesta ofrecida por clínicasabortos.com](#)

¿Se pueden coger ladillas con el contacto por ejemplo de unas sábanas?

Si, vale con que el tejido de la sábana esté infectado para que cojas las ladillas, por lo tanto se puede contagiar una persona de ladillas sin que exista contacto sexual.

[Respuesta ofrecida por clínicasabortos.com](#)

¿Cuáles son los síntomas más frecuentes de la hepatitis B?

Los síntomas más frecuentes que puede sufrir una persona infectada del virus de la [hepatitis B](#) son:

- Dolor de cabeza
- Color amarillento en la piel, en los ojos o en las membranas mucosas.
- Fiebre
- Heces de color claro, etc.

[Respuesta ofrecida por clínicasabortos.com](#)

¿Se puede contagiar el Citomegalovirus teniendo sexo oral?

Si, el **citomegalovirus** se puede contagiar con el sexo oral, con el coito y por contacto personal cercano.

[Respuesta ofrecida por clínicasabortos.com](#)

¿Qué tipo de complicaciones puedo tener si me contagian el Molusco Contagioso?

Puedes tener dos tipos de complicaciones:

- Tener infecciones bacterianas secundarias en la piel.
- Puede producirte lesiones en los genitales persistentes que aumentan su tamaño.

[Respuesta ofrecida por clinicasabortos.com](#)

¿Son dolorosas las lesiones por Chancro?

La lesión de chancro normalmente en la mujer no es dolorosa e incluso puede que no se note, pero en el hombre, la úlcera puede ser muy dolorosa.

[Respuesta ofrecida por clinicasabortos.com](#)

¿Cuándo se pueden transmitir las bacterias del Linfogranuloma Venéreo?

El **linfogranuloma venéreo** puede ser transmitido por contacto sexual en el momento que exista evidencia de lesiones como nódulos o ampollas en la zona genital.

[Respuesta ofrecida por clinicasabortos.com](#)

¿Qué complicaciones puedo tener con la enfermedad pélvica inflamatoria?

Si no la tratas a tiempo puede provocar daño permanente. Puede formarse tejido cicatricial en las [trompas de Falopio](#). Este tejido puede impedir que te quedes embarazada o que el embarazo se forme fuera del útero.

[Respuesta ofrecida por clinicasabortos.com](#)

Tengo la infección por granuloma inguinal ¿es necesario emplear preservativo al inicio de la relación sexual?

Si. Es necesario usar el preservativo desde el comienzo hasta el final de cada relación sexual.

[Respuesta ofrecida por clinicasabortos.com](#)

¿Puedo tener relaciones sexuales durante el tratamiento de la uretritis no gonocócica?

No deberías. Se aconseja una abstinencia sexual de hasta 7 días o hasta que el médico finalice el tratamiento.

[Respuesta ofrecida por clinicasabortos.com](#)

Si estoy infectado de micoplasma genital, ¿qué puedo hacer para no contagiar a mi pareja?

- Se aconseja que no tengas relaciones sexuales hasta que termines el tratamiento y tu médico te de de alta.

- Deberías decir a tu/s pareja/s que estás infectado, para que el/ellos también reciban el tratamiento.

- Ve al médico regularmente, para que pueda detectar a tiempo cualquier enfermedad de transmisión sexual.

[Respuesta ofrecida por clinicasabortos.com](#)

¿Es común la vaginosis bacteriana?

Si. La vaginosis bacteriana es una infección vaginal común en las mujeres que están en edad fértil y mujeres que están embarazadas.

[Respuesta ofrecida por clnicasabortos.com](#)

¿Cómo se transmite el SIDA?

El SIDA se transmite únicamente cuando el virus entra en el torrente sanguíneo de una persona, sangre, semen o flujo vaginal, de otra persona infectada. Se transmite a través de los siguientes fluidos:

- Sangre
- Semen
- Flujo vaginal
- Leche materna.

Las vías de transmisión son la sanguínea y la vía sexual, siendo la sanguínea la que tiene mayor concentración del virus, luego el semen y el flujo vaginal.

[Respuesta ofrecida por clnicasabortos.com](#)

¿Una mujer embarazada puede transmitir la hepatitis B a su hijo?

Si, porque muchas mujeres que son portadoras de la enfermedad, pueden contagiar a sus hijos el día que dan a luz, convirtiendo a sus hijos recién nacidos en portadores de la enfermedad

[Respuesta ofrecida por clnicasabortos.com](#)

¿Se pueden coger ladillas sin que exista penetración?

Si, porque vale sólo con que haya un mínimo contacto entre los pubis para contagiarse con las ladillas.

[Respuesta ofrecida por clnicasabortos.com](#)

¿Es posible recurrir a un simple antibiótico para acabar con los condilomas?

Los condilomas son virales por lo que no son sensibles a los antibióticos. Por lo tanto, el uso de antibiótico no terminaría con los condilomas.

[Respuesta ofrecida por clnicasabortos.com](#)

¿Cómo puedo evitar contagiar el Citomegalovirus a mi pareja?

Para evitar contagiar el citomegalovirus a tu pareja, se aconseja:

- No tener relaciones sexuales vaginales y/o anales.
- No practicar sexo oral.
- Si tienes relaciones sexuales, emplear siempre [preservativo](#).

[Respuesta ofrecida por clnicasabortos.com](#)

¿Cuánto tiempo puede durar la infección del Molusco Contagioso?

Las lesiones del molusco contagioso pueden permanecer de meses a años. Desaparecen sin dejar cicatrices, a menos que te rasques mucho y dejes marcas.

[Respuesta ofrecida por clínicasabortos.com](#)

Ya no tengo lesiones por el Chancro, ¿tengo que seguir con la medicación?

Si. Es importante tomarte todos los antibióticos de principio a fin aunque te sientas bien.

[Respuesta ofrecida por clínicasabortos.com](#)

¿Cuál es el tratamiento para Linfogramuloma Venéreo?

El linfogramuloma venéreo se trata con antibióticos generalmente por vía oral y es importante finalizar toda la medicina prescrita.

[Respuesta ofrecida por clínicasabortos.com](#)

¿Hay mujeres que tienen mayor riesgo de contraer la Enfermedad Inflamatoria Pélvica que otras?

Si. Algunas mujeres tienen más probabilidad de desarrollar la enfermedad pélvica inflamatoria que otras mujeres. Ejemplo:

- Mujeres que han tenido una enfermedad de transmisión sexual como la clamidia y/o la gonorrea.
- Las mujeres sexualmente activas menores de 25 años.
- Mujeres que tienen relaciones sexuales con más de una pareja.
- Las mujeres que usan ducha vaginal.

[Respuesta ofrecida por clínicasabortos.com](#)

¿Cuál es el periodo de incubación del granuloma inguinal?

El periodo de incubación del granuloma inguinal es alrededor de 50 días. A partir de estos días más o menos empiezan a surgir los síntomas.

[Respuesta ofrecida por clínicasabortos.com](#)

¿Cuál es el periodo de incubación de la uretritis no gonocócica?

Generalmente se desarrolla de 2 a 5 días desde que se produce la infección hasta que aparece algún síntoma.

[Respuesta ofrecida por clínicasabortos.com](#)

¿Quiénes están en mayor riesgo de adquirir la infección?

Ya seas hombre o mujer, tienes riesgo de adquirir el micoplasma genital si:

- Tienes muchas parejas sexuales.
- Si estás infectado por el VIH.
- Si practicas sexo sin protección.
- Si usas juguetes sexuales y no están desinfectados.

[Respuesta ofrecida por clínicasabortos.com](#)

Me han diagnosticado Candidiasis Vulvovaginal y no tengo ningún síntoma ¿Es normal?

Si, puede ser normal ya que algunas mujeres no tienen ningún síntoma pero lo más común es que

se detecte la presencia de:

- Flujo vaginal abundante con olor desagradable.
- Ardor en el momento de orinar.
- Molestia en la relación sexual.

[Respuesta ofrecida por clínicasabortos.com](#)

¿El VIH no puede transmitirse a través de?

- Besos profundos, masturbaciones, a no ser que existan heridas abiertas.
- Lágrimas, sudor y saliva, la concentración de **VIH** es tan insignificante y tan pequeña que, aunque haya contacto directo no hay contagio.

- Compartir instrumentos domésticos, vasos, platos,...
- Abrazos, besos en la cara, cogerse las manos...
- Los animales no transmiten la enfermedad.
- En la piscina, ducha, WC, ropa…

[Respuesta ofrecida por clínicasabortos.com](#)

¿Hay riesgo de contagio de la hepatitis B durante una la felación?

Si hay riesgo de contagio de la **Hepatitis B**, si existe contacto con el esperma de la persona contaminada y la sangre como puede ser por ejemplo el caso en el que se tiene una pequeña herida en la boca, una simple gingivitis etc.

[Respuesta ofrecida por clínicasabortos.com](#)

¿Cuáles son los factores de riesgo para contraer ladillas?

- Mantener relaciones sexuales con una persona que tiene ladillas.
- Tener una vida sexual muy activa.
- Compartir ropa íntima o de cama con una persona infectada.

[Respuesta ofrecida por clínicasabortos.com](#)

¿Los condilomas de la vulva se pueden transmitir sexualmente?

Sí, por eso siempre que se mantengan relaciones sexuales hay que utilizar el **preservativo**, el riesgo de contagio es muy elevado.

[Respuesta ofrecida por clínicasabortos.com](#)

¿Dónde está el Citomegalovirus?

El **citomegalovirus** puede encontrarse en:

- La saliva.
- El semen.
- La sangre.
- Las secreciones vaginales.
- En el cuello del útero.
- La orina.
- La leche materna.

[Respuesta ofrecida por clínicasabortos.com](#)

¿Qué tipo de lesiones causa el Molusco Contagioso?

El tipo de lesiones que causa el molusco contagioso son bultos o lesiones en la piel abultadas con forma de perla en la piel

[Respuesta ofrecida por clinicasabortos.com](#)

¿Dónde puedo ver las lesiones de Chancro?

En la mujer suele verse en los genitales externos y en el hombre suele encontrarse entre el surco del glande y el prepucio.

[Respuesta ofrecida por clinicasabortos.com](#)

¿Existen complicaciones Linfogranuloma Venéreo?

Pueden surgir complicaciones como:

- Inflamación del cerebro (muy rara).
- Estrechamiento del recto.
- Conexiones de los tejidos entre el recto y la vagina.
- Hinchazón prolongada de los genitales.
- Infección en hígado, ojos, corazón y articulaciones.

[Respuesta ofrecida por clinicasabortos.com](#)

Me han dicho que no me puedo quedar embarazada porque tengo la Enfermedad Inflamatoria Pélvica. ¿Es verdad?

Si, es verdad, puedes tener complicaciones para poder quedarte embarazada, pero un tratamiento temprano puede ayudar a prevenir los problemas graves que puede generar la enfermedad pélvica inflamatoria en las trompas de Falopio, útero y ovarios (aparato reproductor femenino).

[Respuesta ofrecida por clinicasabortos.com](#)

Me han diagnosticado el Granuloma Inguinal, ¿Puedo tener complicaciones?

Si, puedes tener complicaciones de destrucción del tejido genital, pérdida de color del área genital e hinchazón genital permanente, pero un tratamiento oportuno disminuye las complicaciones.

[Respuesta ofrecida por clinicasabortos.com](#)

¿Qué complicaciones puede tener la uretritis no gonocócica?

La infección de **uretritis no gonocócica** puede ascender por la **uretra** hasta alcanzar el **epidídimo** y producir una epididimitis que puede causar infertilidad (en pocas ocasiones).

[Respuesta ofrecida por clinicasabortos.com](#)

Si tengo relaciones sexuales con una persona virgen, ¿no estoy en riesgo de tener enfermedades de transmisión sexual?

Falso. Puedes contraer enfermedades de transmisión sexual si mantienes relaciones sexuales con una persona virgen, porque muchas personas se siguen considerando vírgenes al no tener penetración vaginal, pero si han practicado el sexo oral o anal, por lo que implican un alto riesgo

para contraer [enfermedades de transmisión sexual](#).

[Respuesta ofrecida por clínicasabortos.com](#)

¿Qué otros síntomas a parte del picor puedo tener con la Sarna (Escabiosis)?

Puedes tener otros síntomas a parte del picor como:

- Desgastes en la piel por rascarte.
- Rayas delgadas sobre la piel.
- Raspaduras.

[Respuesta ofrecida por clínicasabortos.com](#)

¿Hay algún anticonceptivo que evite el VIH?

Hay que utilizar el [preservativo](#) de manera correcta cuando se tengan relaciones sexuales con personas que no se conozcan. Hay que utilizarlo siempre que tengan relaciones vaginales, orales y anales.

[Respuesta ofrecida por clínicasabortos.com](#)

¿Me gustaría saber si existe algún antibiótico eficaz contra las ladillas?

Las ladillas no se tratan con antibiótico sino con productos antiparasitarios, ya que se trata de una infección por parásitos y no por bacterias.

[Respuesta ofrecida por clínicasabortos.com](#)

¿Cómo se puede prevenir el contagio de la hepatitis B?

Existe una vacuna contra la [hepatitis B](#), su función es provocar una reacción inmune en el organismo del receptor, pero no te asustes que eso no quiere decir que provoque la enfermedad. La vacuna puede ser aplicada a niños, adultos y mayores. Por lo general, la vacuna se divide en tres dosis que tienen que ser administradas en un plazo de 6 meses.

[Respuesta ofrecida por clínicasabortos.com](#)

¿Dónde se pueden encontrar las lesiones de Amibiasis Genital?

Las lesiones de Amibiasis genital en la mujer se pueden localizar en la vulva, vagina y útero y en el hombre en el pene.

[Respuesta ofrecida por clínicasabortos.com](#)

¿Qué hago si durante la relación sexual con penetración se rompe el preservativo?

Si mantienes relaciones sexuales con penetración, vaginal o anal, con una persona infectada por el [VIH](#) y se te rompe el [preservativo](#), debes cambiar de manera inmediata el preservativo por uno nuevo, y te recomendamos que te realices las pruebas de diagnóstico del VIH porque has podido tener riesgo de infección.

[Respuesta ofrecida por clínicasabortos.com](#)

Estoy contagiado de criptosporidiosis, ¿Qué síntomas puedo tener?

El principal síntoma que puedes tener al estar infectado por la criptosporidiosis es la diarrea acuosa. Otros síntomas que también puedes tener que acompañan a la diarrea acuosa son dolores abdominales, gases, náuseas, pérdida de peso, vómitos, calambres en la parte inferior del abdomen, pérdida del apetito y deshidratación.

[Respuesta ofrecida por clinicasabortos.com](#)

¿Cómo se diagnostica la hepatitis C?

El médico te realiza un análisis de sangre en el que se indica si existe virus en la sangre, en que cantidad está y el genotipo.

Normalmente también se suele pedir una biopsia hepática, para buscar los signos de la Hepatitis C así como el daño que ha podido producir en el hígado

[Respuesta ofrecida por clinicasabortos.com](#)

¿Puedo contagiarme de Mononucleosis Infecciosa si beso a varios chicos?

Si, puedes contagiarte de la mononucleosis infecciosa porque el virus se contagia por medio de la saliva y también por el contacto de persona a persona.

La mononucleosis infecciosa también se llama enfermedad del beso.

[Respuesta ofrecida por clinicasabortos.com](#)

¿El tratamiento para curar la hepatitis C tiene algún efecto secundario?

El medicamento para tratar la Hepatitis C se llama alfa-interferón y puede producir los siguientes efectos secundarios:

- Salpullidos en la piel.
- Somnolencia
- Cansancio
- Dolor en los músculos
- Dolores de cabeza
- Síntomas parecidos a los de la gripe, etc.

[Respuesta ofrecida por clinicasabortos.com](#)

¿Si no se trata la tricomoniasis puede causar otros problemas?

Por supuesto que sí, una mujer sin el tratamiento tiene más posibilidades de contraer una infección en las trompas de Falopio o en el útero.

La [Tricomoniasis](#) puede llegar a producir infertilidad, embarazos ectópicos o incluso un dolor pelviano crónico. En el caso de que la mujer embarazada padezca tricomoniasis, tanto la madre como el bebé pueden sufrir problemas de salud. Cabe la posibilidad de un parto prematuro y de que el bebé nazca con bajo peso.

[Respuesta ofrecida por clinicasabortos.com](#)

¿Cómo puedo saber si tengo tricomoniasis?

Para saberlo con seguridad, has de acudir a tu médico especialista para que te tome una muestra de la vagina en el caso de la mujer o del pene en el caso del hombre. Se debe consultar con el profesional de salud. El profesional tomará una muestra de la secreción (de la vagina o el pene). La secreción se puede examinar en el mismo consultorio usando un microscopio o se puede enviar la muestra para un análisis en laboratorio.

[Respuesta ofrecida por clínicasabortos.com](#)

¿Si has tenido ya la enfermedad te puedes volver a contagiar?

La respuesta es, sí. Que hayas tenido la enfermedad en algún momento de tu vida, no te da ninguna inmunidad para no volver a contagiarte.

[Respuesta ofrecida por clínicasabortos.com](#)

¿Puedo contagiarme de herpes genital teniendo varias parejas con las que mantengo relaciones sexuales?

Es más fácil que contraiga la enfermedad una persona polígama que una persona monógama, la persona polígama está más expuesta a contraer el herpes genital o cualquier otra [enfermedad de transmisión sexual](#) que una persona que sólo mantiene relaciones sexuales con su pareja.

Recomendamos siempre el uso de [métodos anticonceptivos de barrera](#) como son el preservativo femenino o masculino para reducir el contagio de enfermedades de transmisión sexual.

[Respuesta ofrecida por clínicasabortos.com](#)

Si tengo VPH ¿Qué probabilidades tengo de desarrollar un cáncer de cuello de útero?

No tengas miedo porque en la mayoría de los casos nuestro sistema inmunológico elimina el virus antes de que puedan desarrollarse células anormales.

En general, el problema surge cuando las mujeres infectadas por [Virus del Papiloma Humano](#) lo están durante un tiempo muy largo, esto hace que la probabilidad de desarrollar un cáncer de cuello de útero aumente.

[Respuesta ofrecida por clínicasabortos.com](#)

¿Cuál es la manera de que se detecte una lesión por VPH?

Para detectar dichas lesiones lo mejor es el control citológico realizado por un ginecólogo, lo importante de dichos controles es que se detecten de manera precoz las lesiones que advierten de un posible cáncer.

[Respuesta ofrecida por clínicasabortos.com](#)

¿El cáncer de cuello de útero equivale a no poder tener hijos?

Este caso tan extremo solo ocurre cuando se hace necesario extirpar el útero. En la mayoría de los casos, en las mujeres jóvenes que tienen tumores pequeños la cirugía no conlleva la extirpación

del útero, por lo que no hay ningún problema a la hora de quedarse embarazada y llevar a término la gestación.

[Respuesta ofrecida por clínicasabortos.com](#)

¿Qué me puede pasar si no me trato la enfermedad de la clamidia?

Si no te pones en tratamiento cabe la posibilidad de que se desarrollen complicaciones, como la enfermedad pélvica inflamatoria (EPI), es una enfermedad más dolorosa que ocurre cuando la infección se extiende a los órganos reproductivos.

Esta enfermedad pélvica puede causar en la mujer esterilidad.

En el caso de los hombres, si estos no se tratan la [clamidia](#) pueden sufrir dolor e hinchazón en el área del escroto, y en el peor de los casos puede producir esterilidad en los hombres al igual que en las mujeres.

[Respuesta ofrecida por clínicasabortos.com](#)

¿Cómo se transmite la clamidia?

La clamidia se puede transmitir a través de contacto sexual oral, genital o anal. Cabe la posibilidad de transmitir la enfermedad de madre a hijo durante el parto natural.

[Respuesta ofrecida por clínicasabortos.com](#)

¿Qué consecuencias me puede ocasionar no tratarme la sífilis?

Si no te tratas la [Sífilis](#) puede ocasionarte una infección activa en algún órgano vital como el hígado, el corazón, también puede verse afectado el sistema nervioso, etc.

[Respuesta ofrecida por clínicasabortos.com](#)

¿Estoy embarazada y tengo la sífilis, puede afectar a mi bebe?

Si, porque la bacteria de la sífilis puede afectar al bebe durante el embarazo, por lo que es muy importante que te sometas al tratamiento adecuado de inmediato. Si no te sometes al tratamiento tu bebe puede sufrir un retraso en su desarrollo, o incluso puede provocarle la muerte.

[Respuesta ofrecida por clínicasabortos.com](#)

¿Si me detectan la enfermedad, mi pareja tiene que ser tratada también?

Habría que realizarla una prueba para saber si ya se ha contagiado, porque una persona que está contagiada por la enfermedad en su etapa primaria puede a su vez contagiar a otra.

[Respuesta ofrecida por clínicasabortos.com](#)

¿La gonorrea puede causar esterilidad en la mujer?

Si, la [Gonorrea](#) es una de las causas de esterilidad más comunes en la mujer. En el hombre en algunas ocasiones, cuando la infección se extiende hacia los testículos o al epidídimo puede existir posibilidad de esterilidad.

[Respuesta ofrecida por clínicasabortos.com](#)

¿Qué factores de riesgo existen para contraer la Gonorrea?

- Tener muchas parejas sexuales
- Tener una pareja que mantiene relaciones con otras personas sin utilizar la protección adecuada.
- Mantener relaciones sexuales sin la protección necesaria.

[Respuesta ofrecida por clínicasabortos.com](#)

¿La gonorrea puede hacerse crónica?

Sí. Siempre que sea tratada de manera inadecuada, de esta manera el germen puede mantenerse inactivo en la zona genital durante mucho tiempo.

[Respuesta ofrecida por clínicasabortos.com](#)

¿Se puede coger una enfermedad de transmisión sexual en los aseos públicos?

No, rotundamente no. No se puede coger una enfermedad de transmisión sexual en los aseos públicos. La manera de contagiarse de una ETS es a través de la sangre, las secreciones genitales, el esperma o la saliva pero no por el contacto entre la piel y la taza del baño.

Para que exista contagio una de las personas implicadas en la relación sexual debe tener una enfermedad de transmisión sexual.

[Respuesta ofrecida por clínicasabortos.com](#)

¿Las enfermedades de transmisión sexual se pueden curar?

La mayoría de ellas si pueden curarse, lo más importante es detectarlas a tiempo para seguir el tratamiento adecuado.

Lo más importante es que las enfermedades de transmisión sexual pueden prevenirse, utilizando correctamente el preservativo.

[Respuesta ofrecida por clínicasabortos.com](#)

¿Cuáles son los síntomas más claros para saber si tengo una enfermedad de transmisión sexual?

En el caso de los hombres los síntomas externos más claros son:

- Heridas o llagas, verrugas o ampollas en el pene, los testículos o zona peri-anal.
- Si sale pus por el pene, ardor al orinar, etc.

En el caso de las mujeres los síntomas externos más claros son:

- Heridas o llagas en la vagina o sus alrededores.
- Dolor al mantener relaciones sexuales.
- Flujo vaginal diferente, olor más fuerte, color diferente, etc.

[Respuesta ofrecida por clínicasabortos.com](#)